

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP -2-3-66 477298

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION DE LA STATION DE RENNES (Tél. 40-00-74)
(CALVADOS, COTES-DU-NORD, FINISTÈRE, ILLE-ET-VILAINE, MANCHE, MAYENNE, MORBIHAN, ORNE)
Régisseur de recettes de la Protection des Végétaux, Route de Fougères - RENNES, (face à l'Hippodrome)
C. C. P. : RENNES 9.404-94

ABONNEMENT ANNUEL
15 F.

Supplément n° 1 au Bulletin n° 65

28 Février 1966

AVERTISSEMENTS

ARBRES FRUITIERS

TAVELURE DU POIRIER -

Les premières projections d'ascospores ont été observées. Celles-ci, ainsi que les conidies provenant de chancres sur rameaux, sont susceptibles de produire des contaminations sur les variétés ayant atteint ou dépassé le stade C3-D (séparation des écailles des bourgeons floraux et apparition du sommet des boutons).

En conséquence, il est indispensable d'effectuer, dès que possible, un traitement sur toutes ces variétés.

Sur celles à débourrement plus tardif, ce traitement sera réalisé dès qu'elles parviendront au stade précité.

INFORMATIONS

MALADIES CRYPTOGRAMIQUES DU FRAMBOISIER

Des traitements cupriques (125 g. de cuivre métal à l'hl) effectués à environ 15 jours d'intervalle, depuis le débourrement jusqu'à la floraison, permettent de limiter le développement des principales maladies cryptogamiques du framboisier notamment de *Didymella aplanata*.

Les Contrôleurs chargés des
Avertissements Agricoles,
F. BARBOTIN et G. PAITIER.

L'Inspecteur
de la Protection des Végétaux,
J. DELOUSTAL.